

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DAL CORPO ESTRANEO



Dr. Arturo Giustardi

A.I.C.I.P. Società Italiana per la Cure in Perinatologia

OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE: LATTANTE COSCIENTE

Se l'ostruzione è parziale ed il lattante è in grado di respirare, di tossire con forza e piangere, NON ESEGUIRE ALCUNA MANOVRA



Il lattante non riesce più a piangere, tossisce debolmente e la respirazione diventa difficoltosa. Prendilo in braccio e stringi con una mano la parte ossea della mandibola.



Siediti e poni il lattante a faccia in giù sul tuo avambraccio, sostenendogli bene il capo, appoggiandolo sulla tua coscia.



Con il palmo della mano libera esegui 5 colpi sulla schiena, tra le scapole (colpi interscapolari con via di fuga laterale per non colpire il capo).



Ruota il piccolo sul dorso facendo attenzione a sostenere sempre il capo.



Esegui 5 compressioni sul torace, utilizzando 2 dita.



Ripeti la sequenza di 5 colpi sulla schiena e 5 compressioni del torace finché il corpo estraneo non esce e il piccolo riprende a piangere o finché non perde conoscenza.

OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE: LATTANTE INCOSCIENTE



Adagia il piccolo in posizione supina su una superficie rigida, possibilmente sollevato da terra, per esempio un tavolo e chiedi aiuto ad alta voce. Se qualcuno risponde alla richiesta di aiuto, chiedigli di allertare il 118.



Effettua 5 ventilazioni bocca/naso



Procedi con le manovre di rianomazione cardio-polmonare, iniziando dalle compressioni toraciche di 30 compressioni. Effettua 2 ventilazioni bocca/naso e ripeti tutta la operazione.

112

Allerta il 112. Riprendi la rianimazione cardio-polmonare fino all'arrivo del soccorso medico d'emergenza 112.

NOTA:

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DAL CORPO ESTRANEO



Dr. Arturo Giustardi

A.I.C.I.P. Società Italiana per la Cure in Perinatologia

OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE: BAMBINO/ADOLESCENTE COSCIENTE



Il bambino è in grado di respirare, parlare, tossire con forza e piangere.



Tranquillizzalo dicendogli che lo stai aiutando e incoraggiarlo a tossire

OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE: BAMBINO/ADOLESCENTE COSCIENTE

Esegui la manovra di Heimlich (applicabile sui bambini oltre i 12 mesi di età e fino alla pubertà).



Collocati in piedi o inginocchiato dietro il bambino, circondagli i fianchi con entrambe le braccia. Con il pugno chiuso e l'altra mano che lo afferra sopra, effettua delle decise compressioni, verso di te e verso l'alto, nell'addome del bambino.



Con questa manovra, si esercita sotto il diaframma una pressione che spinge verso l'alto l'aria residua e determina un potente "colpo di tosse artificiale" che potrebbe rimuovere il corpo estraneo.

OSTRUZIONE TOTALE DELLE VIE AEREE: BAMBINO/ADOLESCENTE INCOSCIENTE

Adagia il bambino al suolo in posizione supina e chiedi aiuto ad alta voce.



Procedi con le manovre di rianomazione cardio-polmonare (RCP), iniziando dalle compressioni toraciche (profonde circa 4-5 cm) eseguite con una o due mani.



Dopo 30 compressioni toraciche, prima di effettuare 2 ventilazioni, controlla nella bocca e rimuovi il corpo estraneo solo se è ben visibile.

112

Allerta il 112. Riprendi la rianomazione cardio-polmonare fino all'arrivo del soccorso medico d'emergenza 112.

NOTA: